

## Vorgehen bei Zahnverletzungen

### **Milchzähne**

Zahnunfälle mit Milchzähnen können Schäden an den noch im Kiefer sitzenden, bleibenden Zähnen verursachen.

### **Abgebrochene Milchzähne**

Je mehr abgebrochen ist, umso dringender ist es, den Zahnarzt zu konsultieren.

### **Gelockerte Milchzähne**

Eine Behandlung ist nicht dringend (innerhalb von Tagen Zahnarzt konsultieren).

### **Verschobene Milchzähne**

Eine Behandlung ist dringend. Der Zahn muss möglichst bald an seinen richtigen Platz zurückgeführt werden. Nach Möglichkeit direkt nach dem Unfall selbst versuchen, den Zahn/die Zähne zurück in die alte Position zu schieben.

### **Herausgeschlagene Milchzähne**

Eine Behandlung ist nicht dringend, da es in den meisten Fällen nicht zweckmässig ist, ausgeschlagene Milchzähne wieder einzusetzen (innerhalb von Tagen Zahnarzt konsultieren).

### **Hineingeschlagene Milchzähne**

Eine Behandlung ist nicht immer nötig. Auf jeden Fall aber den Zahnarzt konsultieren!  
(Höchstes Risiko für den bleibenden Zahn!)

### **Bleibende Zähne**

Die Chance für langfristige Erhaltung verletzter bleibender Zähne ist umso besser, je rascher die korrekte Behandlung erfolgt (am besten innert Stunden).

### **Abgebrochene bleibende Zähne**

Suchen Sie grosse abgebrochene Stücke, legen Sie diese in kaltes Wasser oder noch besser in kalte Milch ein und bringen Sie diese zur Behandlung mit. Je mehr abgebrochen ist, umso dringender ist eine Behandlung.

### **Gelockerte und verschobene bleibende Zähne**

Situation belassen und nicht an den Zähnen manipulieren, Mund nur vorsichtig schliessen. Eine Behandlung ist dringend. Der Zahn muss möglichst bald an seinen richtigen Platz gedrückt und eventuell geschient werden.

### **Herausgeschlagene bleibende Zähne**

Zahn suchen und nur an der Zahnkrone, nicht an der Zahnwurzel anfassen. Nach Möglichkeit den Zahn sofort selbst zurück ins Zahnfach schieben. Bei sichtbarer Verschmutzung den Zahn vorgängig mit kaltem Wasser abspülen. Ist dies nicht möglich, Zahn ohne Reinigung so schnell als möglich in kalter Milch, steriler Kochsalzlösung (Arzt oder Apotheke) oder in speziellem Zahnrettungsfläschen mit Nährlösung lagern (Dentosafe®). In jedem Fall sofort den Zahnarzt aufsuchen!

### **Hineingeschlagene bleibende Zähne**

Sofort den Zahnarzt aufsuchen! Der Zahn muss an seinen ursprünglichen Platz zurückgebracht und geschient werden.